



NON-PERMANENT FILLER

SILK

INTRODUKTION

Non-permanente fillers er en serie af sterile injicerbare geler, som består af hyaluronsyre og saltvand. Nogle af disse er tilsat lidocain, som er lokalbedøvelse. Hyaluronsyre er et sukkerstof som findes naturligt i kroppens bindevæv.

Når hyaluronsyren injiceres i huden og bindevævet, integreres den med det omgivende væv og tilfører volumen. Derudover binder hyaluronsyren vand og fugter huden indefra samtidig med at den øger hudens elasticitet og virker foryngende. Non-permanente fillers bruges derfor til at udglatte rynker og genskabe volumen i områder, hvor dette er tabt. Eller hvor man blot ønsker mere ned hvad naturligt forekommer. Desuden kan non-permanente fillers bruges til skulpturere ansigtet eller lave konturering fx til at skabe større symmetri eller give et naturligt løft.

FØR BEHANDLING

Vi anbefaler at du undgår fiskeolie og andre kosttilskud med blodfortyndende effekt samt håndkøbsmedicin som Iprex, Treo og Kodimagnyl i 4 dage forud for behandlingen, da dette øger risikoen for blå mærker. Desuden skal huden i det behandlede område være uden tegn på infektion eller sårdannelse.

Overholdes ovennævnte forholdsregler ikke, aflyses eller udskydes behandlingen. Og vi aflyser i tilfælde, hvor vi vurderer, at der er øget risiko for bivirkninger.

Det behandlede område fotodokumenteres før at behandlingen kan initieres.

UNDER BEHANDLING

Behandlingsplanen gennemgås og vi foretager en forventningsafstemning sammen. Herefter rengøres og desinficeres huden. De relevante områder identificeres.

Behandlingen foregår gennem indsprøjtning af hyaluronsyre i de relevante områder. Behandlingen er ikke smertefuld, men moderat smerte kan opleves i forbindelse med indstikket. Til læbeområdet kan man supplere med lokalbedøvende creme, som påføres op til 20 min. før behandlingen.

EFTER BEHANDLING

Ifølge lovgivningen om kosmetisk behandling skal det behandlede område fotodokumenteres efter behandlingen.

Resultatet kan ses med det samme, men der kan i dagene efter opleves let rødme, hævelse og ømhed i behandlingsområdet. Fuld integration af filler produktet kan tage op til 4 uger.

Der vil i nogle tilfælde forekomme blå mærker i huden, som er helt normalt, og som forsvinder igen indenfor 1 uge. Der kan i sjældne tilfælde forekomme infektion i det behandlede område. Derfor bør unødigt berøring samt brug af make-up og cremer undlades i mindst 4 timer efter behandling.

Undgå desuden at dyrke hård motion i 3 dage og sauna/solarium i 2 uger efter behandlingen, da hyaluronsyren forbrændes hurtigere under kraftig varme i de første uger efter behandlingen. Undgå desuden blodfortyndende præparater samt større alkoholindtagelse i op til 2 døgn efter behandling, eftersom det øger risikoen for blå mærker og blødninger.

Holdbarheden af behandlinger med non-permanente fillers er individuelt varierende, men afhænger bl.a. af hvor i ansigtet at produktet er injiceret og af filler produktet. Områder med meget aktivitet nedbrydes produktet hurtigere. Holdbarheden i læberne er således 4-6 måneder og i huden 9-18 måneder. Gentagne og regelmæssige behandlinger kan forlænge holdbarheden.

BIVIRKNING/RISICI

Der kan i sjældne tilfælde forekomme blå mærker eller infektion i det behandlede område. Har man tendens til hyppige herpesudbrud kan en injektionsbehandling fremprovokere et nyt udbrud. Derfor anbefales det i disse tilfælde at få en forebyggende behandling. Tegn på infektion kan være rødme, ømhed og hævelse af huden med eventuel ledsagende feber og opleves som en pludselig forværring. Ved infektion behandles man med antibiotika. Blålig misfarvning under øjnene og nasolabialfolderne kan i sjældne tilfælde forekomme, hvis produktet ligger for overfladisk.

Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk chok ses ekstremt sjældent og kræver hurtig behandling. Filler produktet kan bestå af lidocain, som i yderst sjældne tilfælde kan fremprovokere en allergisk reaktion.

Filler produktet integrerer sig vanligtvis fuldt i vævet, men kan i sjældne tilfælde danne mindre knuder, som normalt aftager spontant og kan masseres væk. I meget sjældne tilfælde kan der opstå granulomer (bindevævsknuder under og i selve huden). Filler produktet kan potentielt også tilstoppe et blodkar med risiko for nekrose af væv og med risiko for blindhed til følge. Det skal dog på det kraftigste understreges at disse tilfælde er yderst sjældne og at der kun er registreret få tilfælde på verdensplan. Skulle der mod forventning opstå et uønsket resultat af behandlingen, er det muligt let og enkelt at opløse produktet med et enzym kaldes hyaluronidase, som nedbryder produktet igen.

KONTRAINDIKATIONER

Graviditet og amning.

Allergi overfor indholdsstoffer (lidocain).

Allergi for hvepse/bistik, der kræver EpiPen.

Blødersygdom/hæmofili.

Aktiv infektionsudbrud på behandlingsdagen i behandlingsområdet.

Silikoneimplantater eller trådløft i behandlingsområdet.



SAMTYKKE

Efter at have læst den skriftlige information modtages mundtlig information, hvor der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Behandlingen gives først efter der er afgivet samtykke, men kræver en betænkningstid på mindst 48 timer fra den mundtlige information er givet. Du er velkommen til at medbringe en bisidder. I henhold til databeskyttelsesordningen giver jeg som kunde hermed mit samtykke til, at klinikken må kontakte mig per mail og telefonisk ud fra de oplysninger jeg har givet.

SILK
Bremerholm 31
1069 København K

Version juli 2022